




Cuprocyparis leylandii



Hoogte	15 - 30 m, snelgroeiend
Kroon	zuilvormig tot smal piramidaal, dichte kroon
Schors en takken	twijgen licht roodbruin, bast roodbruin, iets afschilferend
Blad	spitse schubben, dof middengroen, wintergroen
Bloemen	onopvallend
Vruchten	ronde, roodbruine kegels, 2 cm
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	iedere goed doorlatende, voldoende vochtige bodem
Verharding	verdraagt geen verharding
Winterhardheid	7a (-17,7 tot -15,0 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen wind
Toepassing	begraafplaatsen, kustgebieden, industriegebied, grote tuinen, boomsingel
Vorm	hoogstam boom, solitaire conifeer, haagplant
Oorsprong	C.J. Leyland, Leighton Park, Welshpool, Wales, 1888
Synoniemen	× Cupressocyparis leylandii

Grote zuilvormige tot smal piramidale conifeer met een dichte vertakking, die gemakkelijk kan uitgroeien tot een boom van 15 tot 30 m hoogte. De bast is roodbruin en laat op latere leeftijd los in lange, vezelachtige platen. De jonge twijgen zijn eerst groengeel, later licht roodbruin. Het loof is dof middengroen. De boom groeit op alle gronden, mits goed doorlatend en voldoende vochtig, en verdraagt ook veel wind. Ze behoort, naast verschillende cultivars van *Chamaecyparis lawsoniana* en *Thuja*, tot de meest populaire haagplanten. De van nature smalle habitus is een voordeel bij het gebruik als haag en daarbij is de boom zeer goed te snoeien. Vanwege de krachtige groei moet er twee keer per jaar worden gesnoeid en dan ontstaat een zeer dichte haag. De boom ontstond in 1888 uit een kruising tussen *Chamaecyparis nootkatensis* en *Cupressus macrocarpa*. Nieuwe inzichten leidden ertoe dat *C. nootkatensis* in een ander geslacht werd ingedeeld (*Xanthocyparis*). Dit had tot gevolg dat de hybridesoortnaam × *Cupressocyparis* voor *C. leylandii* niet gehandhaafd kon worden. Om de wijziging zo klein mogelijk te houden, is gekozen voor × *Cuprocyparis*.