




Acer x zoeschense 'Annae'



Hoogte	8 - 10 m
Kroon	rond bolvormig, halfopen kroon
Schors en takken	bast grijsbruin, jonge twijgen rood
Blad	3/5-lobbig, donkergroen, 5 - 8 cm
Herfstkleur	oranje, rood
Bloemen	geelgroene bloemtuilen, mei
Vruchten	behaard, opstaande vleugels, 3 - 5 cm
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	alle
Verharding	verdraagt halfverharding
Winterhardheid	6a (-23,3 tot -20,6 °C)
Windbestendigheid	goed
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind
Faunaboom	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen wind, waardboom voor vlinders
Toepassing	parken, speelpleinen, boombakken, begraafplaatsen, daktuinen, industriegebied, grote tuinen
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Schwerin, Duitsland, 1908

Deze middelgrote boom is een hybride tussen *A. campestre* en *A. cappadocicum* subsp. *lobelii*. *A. zoeschense* 'Annae' heeft een open, vrijwel bolvormige kroon. De boom heeft een regelmatige, etagevormige habitus en kan een hoogte van circa 10 m bereiken. De jonge en slanke twijgen die voldoende zonlicht krijgen, kleuren opvallend roodbruin. Oudere takken hebben een grijsbruine kleur. *A. zoeschense* 'Annae' vormt geen kurk op de twijgen. Het wat op *A. campestre* gelijkende blad loopt donkerpaars uit en verkleurt langzaam donkergroen. De bladrand is wat meer gegolfd dan bij *A. campestre* en het blad is wat groter. Belangrijke sierwaarde is de herfstverkleuring van het glanzend donkergroene blad in vele tinten rood tot oranje. Op een zonnige standplaats vaak beter uitkomend. De fijne wortelgroei is oppervlakkig. Goed bestand tegen luchtvervuiling en ongevoelig voor ziekten en plagen.