



Fraxinus angustifolia 'Raywood'



Hoogte	15 - 20 m
Kroon	breed eivormig tot rond, halfopen kroon
Schors en takken	op oudere leeftijd diepgegroefd
Blad	oneven geveerd, 9 - 13 blaadjes, diepgroen, 15 - 25 cm, geveerd blad
Herfstkleur	oranje, rood, purper
Bloemen	onopvallend geelgroen, in kleine pluimen, april
Vruchten	geen, vruchtloze cultivar
Stekels/doorns	Geen
Giftigheid	gewoonlijk niet giftig voor mensen, (grote) huisdieren en vee
Grondsoort	niet te rijke bodem, i.v.m. groeisnelheid
Bodemvochtigheid	kan op droge grond, kan op natte grond
Verharding	verdraagt verharding
Winterhardheid	6a (-23,3 tot -20,6 °C)
Windbestendigheid	slecht bij te harde groei
Overige bestendigheden	bestand tegen vorst (WH 1 t/m 6), bestand tegen strooizout
Toepassing	lanen en brede straten, parken, speelpleinen, begraafplaatsen, grote tuinen, boomsingel
Vorm	hoogstam boom, meerstammige boom
Oorsprong	Australië, 1920
Synoniemen	Fraxinus a. 'Flame', Fraxinus a. wollastonii

Gezonde, maar niet sterk groeiende selectie met een ietwat onregelmatige kroonvorm. *F. angustifolia* 'Flame' en 'Wollastonii' zijn identiek aan 'Raywood' en kunnen daarom als synoniemen worden beschouwd. De hoofdtak groeit recht en de gesteltakken zijn schuin opgaand. De schors is grijs en op latere leeftijd diep gegroefd, twijgen kleuren van olijfgroen naar grijsgroen. 'Raywood' heeft als jonge boom een gesloten kroon, oudere bomen worden half open. Het glanzende, diepgroene blad bestaat uit 9 - 13 smalle deelblaadjes. Deze zijn circa 5 - 10 cm lang. In de herfst kleurt het blad oranje-achtig tot diep paarsrood. Op warmere grond en in een warme herfst is de herfstkleur intenser. Na de onopvallende bloei vindt geen vruchtzetting plaats. Op vruchtbare bodems is de groei vaak sneller dan op schrale gronden. Takbreuk kan dan het gevolg zijn.